

**Wieloskładnikowy nawóz
makroskładnikowy wzbogacony
bakteriami z grupy *BACILLUS***

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus licheniformis



Charakterystyka:

- ✓ Zwiększenie odporności roślin na patogeny
- ✓ Zmniejszenie ilości dawek stosowanych środków ochrony roślin
- ✓ Można stosować łącznie z produktami o wysokiej koncentracji miedzi
- ✓ Poprawia jakość oraz ilość plonu
- ✓ Większe przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny
- ✓ Zwiększenie odporności na stres suszy, poprzez gromadzenie w tkankach substancji zabezpieczających roślinę przed ubytkiem wody oraz wzrostem ciśnienia osmotycznego



MAKROSKŁADNIKI (całkowicie rozpuszczalne w wodzie)		
Azot całkowity	N	20,0% m/m
Azot w postaci azotu azotanowego	NO ₃	3,9% m/m
Azot w postaci azotu amonowego	NH ₄	2,9% m/m
Azot w postaci azotu mocznikowego	NH ₂	13,2% m/m
Pięciotlenek fosforu	P ₂ O ₅	20,0% m/m
Tlenek potasu	K ₂ O	20,0% m/m
Tlenek magnezu	MgO	0,5% m/m
Tritlenek siarki	SO ₃	1,2% m/m

MIKROSKŁADNIKI (całkowicie rozpuszczalne w wodzie)			
Bor	B	w postaci soli	0,05% m/m
Miedź	Cu	całkowicie schelatowana przez EDTA	0,06% m/m
Żelazo	Fe	całkowicie schelatowane przez EDTA	0,12% m/m
Mangan	Mn	całkowicie schelatowany przez EDTA	0,08% m/m
Molibden	Mo	w postaci molibdenianu amonu	0,002% m/m
Cynk	Zn	całkowicie schelatowany przez EDTA	0,06% m/m

NAWÓZ ZAWIERA DODATKOWO BAKTERIE GRUPY BACILLUS

Bacillus subtilis w liczbie 1×10^6 CFU/g

Bacillus amyloliquefaciens w liczbie 1×10^6 CFU/g

Bacillus licheniformis w liczbie 1×10^6 CFU/g

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Uprawa	Termin stosowania	Dawka (kg/ha)
Rzepak	Jesień - faza 4-6 liści	2,0-4,0
	Wiosna - od fazy zielonego pąka 2 razy	
Burak	Od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi 2-3 razy	3,0-5,0
Kukurydza	Od fazy 4-6 liści do osiągnięcia 50-75 cm wysokości 3 razy	3,0-5,0
Ziemniak	Od fazy zawiązywania bulw do kwitnienia 2-3 razy	3,0-5,0
Zboża	Jesień - faza 3-4 liści	2,0-4,0
	Wiosna - od fazy strzelania w źdźbło 2-3 razy	
Owoce/Warzywa	2-3 zabiegi w czasie intensywnego wzrostu	2,0-4,0

